



GATUNKI WRAŻLIWE:

- JELENIOWATE (jelenie, sarny, daniele, łosie)
- DZIKI
- MUFLONY
- ŻUBRY

Wirus przenosi się przez kontakt bezpośredni pomiędzy zwierzętami, poprzez zanieczyszczone ręce, przedmioty takie jak narzędzia, sprzęt, pojazdy, a nawet ubrania i buty, za pośrednictwem produktów pochodzenia zwierzęcego – skóry, trofea myśliwskie itp.

Zwłoki dzików mogą stanowić długotrwały rezerwuár wirusa

PRYSZCZYCA JEST JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ ZARAŻLIWYCH CHOROÓB ZWIERZĄT PARZYSTOKOPYTNYCH

Ze zwierząt dzikich wirus może przenieść się na zwierzęta gospodarskie i wywołać ogromne straty ekonomiczne kraju.

WSZYSCY jesteśmy odpowiedzialni - zapobiegajmy szerzeniu się wirusa!



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
WETERYNARII WE WROCŁAWIU

ul. Januszowicka 48
53-135 Wrocław



Obraz autorstwa vladimircech na Freepik

PRYSZCZYCA (FMD)

U ZWIERZĄT DZIKICH

NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE DLA
MYŚLIWYCH I LEŚNIKÓW



PAMIĘTAJ!!! NIE WSZYSTKIE ŚRODKI WIRUSOBÓJCZE DZIAŁAJĄ NA WIRUSA PRYSZCZYCY

wirus pryszczycy **nie jest** wrażliwy
m.in. na alkohol i związki jodu



TRANSMISJA, PRZEŻYWALNOŚĆ WIRUSA

Duża przeżywalność wirusa
w środowisku:

- do 50 dni w wodzie
- do 74 dni na pastwisku
- w glebie, oborniku,
wysuszonych wydzielinach
i wydalinach, słomie, sierści
i skórze – do 2 miesięcy
- 11 - 13 tyg. na butach
- w mięsie solonym i peklowanym
nawet do 190 dni

Wirus pryszczycy jako najmniejszy wirus
rozprzestrzenia się **również z wiatrem.**

ŚWIADOMOŚĆ

KAŻDE PODEJRZENIE PRYSZCZYCY
NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ
SŁUŻBOM WETERYNARYJNYM

POTWIERDZENIE WYSTĄPIENIA
PRYSZCZYCY MOŻE NASTĄPIĆ JEDYNI
PO UZYSKANIU WYNIKU DODATNIEGO
W BADANIACH LABORATORYJNYCH

**Wirus pryszczycy nie jest
niebezpieczny dla ludzi.
Zakażenia pryszczycą u ludzi
są niezwykle rzadkie i
zazwyczaj mają łagodny
przebieg.**

ZAPOBIEGANIE

Przestrzegaj zasad bioasekuracji,
w tym:

- niezwłocznie wypierz odzież
łowiecką po kontakcie ze
zwierzętami
- umyj i zdezynfekuj obuwie
- oczyść koła pojazdu
- wyczyść i zdezynfekuj używany
sprzęt

OBJAWY

- pęcherze, nadżerki występujące
na dziąsłach i języku
- zmiany skórne (pęcherze,
nadżerki) przestrzeni
międzypalcowej
- kulawizna
- ślinienie
- gorączka